





aspect général symptomatique d'un palmier infesté



palme infestée



palme tombée au sol
avec cocons



SRPV - HYERES (83400)

larve



adultes et chrysalides

Ville d'Hyères-les-Palmiers
service Agriculture, Espaces Verts
04 94 00 78 65

Service Régional de la Protection des Végétaux
04 94 01 42 05


Hyères
LES PALMIERS
www.hyeres.fr



www.hyeres.fr

Ville d'Hyères-les-Palmiers

Rhynchophorus ferrugineus



Le charançon rouge du palmier


Hyères
LES PALMIERS

Gestion des foyers



Depuis le mois de novembre 2007 la Ville d'Hyères, qui avait à cœur d'enrayer la progression du Charançon Rouge du Palmier (CRP), prenait en charge l'élimination des foyers sur la commune, y compris chez les particuliers.

Malgré le frein apporté à la progression de l'insecte, celui-ci prolifère encore de façon importante.

Il est nécessaire d'assurer la sécurité sur le domaine public et la priorité est donnée aux palmiers menaçant les administrés sur les trottoirs et autres lieux publics.

C'est pourquoi un arrêté du 8 octobre 2011, stipulant que la Ville ne prend désormais plus en charge les interventions chez les particuliers et les autres organismes non communaux a été pris.

Par ailleurs, un arrêté ministériel du 21 juillet 2010 autorise la technique d'assainissement au lieu de

l'abattage systématique. **Il fait aussi obligation de déclaration des foyers par les propriétaires, et obligation d'élimination des foyers.**

Cet arrêté décrit le protocole d'intervention et stipule en particulier que **les interventions sur palmiers attaqués par le charançon doivent être effectuées par une personne agréée, ayant suivi une formation spécifique.**

La liste des professionnels agréés est disponible auprès de la Chambre d'Agriculture du Var, du Service Régional de la Protection des Végétaux antenne d'Hyères (SRPV au Lycée Agricole d'Hyères), et de la Ville d'Hyères (service Agriculture Espaces Verts)

Il est possible de contacter le service Agriculture Espaces Verts de la Ville (04 94 00 78 65) pour déclarer un foyer, mais aussi pour établir un diagnostic et demander conseil.

La déclaration auprès de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF/SRPV/PACA) est obligatoire (04 94 01 42 05), mais la Ville peut se faire le relais pour effectuer les démarches de déclaration des foyers.

Il est donc utile de juger de l'opportunité ou non d'avertir le service Agriculture Espaces Verts de la ville d'Hyères.

Ce dépliant vous aidera à identifier les premiers symptômes pour appeler en cas de doute.



© JC Jamouille - www.galerie-insecte.org

Le charançon rouge du palmier

Rhynchophorus ferrugineus est un nouveau ravageur qui représente une grave menace pour les palmiers du bassin méditerranéen.

Il a été identifié en France depuis 2006. L'adulte est un charançon de 2 à 4 cm de long, doté d'un long rostre, au corps orangé vif avec des taches noires. Il vole surtout de jour entre 25 et 40°C. Doué d'un vol puissant, il peut franchir plus de 7 kilomètres. Les femelles pondent toute leur vie entre 100 et 300 oeufs. La larve, qui mesure au maximum 5 cm de long, est le stade nuisible. Elle détruit le système vasculaire en creusant des galeries dans le stipe. Le stade larvaire dure de 1,5 à 4 mois, jusqu'à 9 mois

si la larve cesse de se développer en hiver.

A la fin de sa croissance, elle migre à la périphérie du stipe ou à la base des palmes et elle construit un cocon de fibres végétales où s'effectue la nymphose.

Les générations se chevauchent et l'on trouve tous les stades à chaque moment de l'année.

Le mode de vie des larves (dans le stipe), et des adultes (dans les infractuosités) rend cet insecte difficile à observer.

Symptômes et dégâts

Les palmiers attaqués présentent très peu de symptômes apparents. Mais lorsque tout l'intérieur est rongé, ils meurent subitement et peuvent casser sous l'effet du vent, ce qui est très dangereux pour le public dans les villes, et les particuliers dans leur jardin.

L'attaque du bourgeon terminal entraîne l'affaissement et le dessèchement brusques des palmes, parfois avec une inclinaison anormale du houppier. Avant la mort du palmier, on peut observer quelques signes discrets d'at-



taque : encoches de quelques palmes, cocons insérés à la base des palmes, couronne desséchée et désaxée, trous à la base des palmes taillées.

La présence du charançon peut aussi être signalée par des suintements liquides bruns et visqueux ou par de petits monticules bruns de fibres broyées.

©Christina Hoddie - University of California

